DELLE SPECIE NUOVE DI FUNGHI

RITROVATE NEI CONTORNI DI FIRENZE E NON REGISTRATE NEL *SYSTEMA NATURÆ* DI LINNEO EDIZIONE XIII.

MEMORIA

Del Sig. Giuseppe Raddi Fiorentino

Presentata il dì 4 Giugno 1806

DAL SIGNOR GIOVANNI FABBRONI

Agaricus subscrispus.

Solitario, e grandissimo. Il Cappello piano, rosso-ocraceo con il margine striato ondulato, e quasi increspato. Le Lamelle carnicine, e parimente ondulate. Il Gambo color verde uliva, carnoso, e ingrossato alla base. Tav: I.

a. parte inferiore:

b. porzione del Cappello veduto superiormente.

Trovasi in Autunno lungo l' Argine del fiume Ema.

Agaricus-niger.

Solitario e grandissimo. Il Cappello piano, ocraceo-ferrugineo, con fascie concentriche, ovvero zone verdi, e con il margine intero. Le Lamelle nere, numerosissime, carnose, e assai lucide. Il Gambo carnoso, pallido, gobbo, e più sottile verso la base. Tav: II.

a. parte inferiore

b. porzione del Cappello veduto superiormente.

Nel mese di Novembre nei Boschi presso la Certosa di Firenze sul Fiume Greve.

Agaricus fusco-cano-tomentosus.

Il Cappello piano, fuscescente e tomentoso, tomento bianco Le Lamelle bianchissime, crasse, e molto fragili. Il Gambo cilindrico, pieno, egualmente tomentoso, e un poco più colorito del Cappello. Tav: II. fig. 2.

Nel mese d' Ottobre in Boboli.

Agaricus involucratus.

Solitario, e di statura mediocre. Il Cappello convesso e quasi conico, ottuso, e colore argentino assai splendente. Le Lamelle bianche. Il Gambo bianco, pieno, e con un Anello, o piuttosto involucro bianco, il quale involge tutto il Cappello prima del suo sviluppo a guisa di Volva, e dopo si perde interamente, restando soltanto diversi pezzetti del medesimo attaccati sopra la superficie del Cappello mediante un umore glutinoso contenuto in principio sopra la superficie suddetta. Tav: III. fig. 1.

a. Il Fungo adulto già sviluppato.

b. Il medesimo quando comincia a svilupparsi, e lacerarsi l' involucro.

In Autunno nelle R. Cascine presso la Ghiacciaja non molto distante dalla R. Villa.

Agaricus elegans.

Il Cappello concavo, d' un bellissimo verde, e quasi lobato al margine. Le Lamelle pavonazze, fragili, e che scendono un pochetto sul gambo, il quale è in parte pallido, ed in parte oscuro, con strie sanguigne, pieno, ingrossato e lanoso alla base. Tav: III. fig. 2.

Questa è la più bella specie, ch'io abbia veduto fra gli Agarici in ragione dei suoi vivi colori.

Nel mese di Ottobre nella Ragnaja del Vecchietti circa tre miglia fuori della Porta Romana.

Aga-

Agaricus pixidatus.

Minuto, in forma di pisside, e quasi simile nella sua figura al Lichene pissidato. Il Cappello, e il gambo sono di colore rosso ocraceo. Le Lamelle gialle semplicissime, e quasi decurrenti. Tav: III. fig. 3.

In Autunno nel Bosco dei Cappuccini.

Agaricus dentatus.

Il Cappello quasi conico ottuso, non carnoso, di color sanguigno alquanto trasparente e con il margine dentato. Le Lamelle giallognole. Il gambo color di Zafferano, internamente bianco, fistuloso, fragile, e un poco contorto. Tav: III. fig. 4.

Nel mese di Novembre in Boboli in un piccolo Boschetto vicino all' Isolotto dalla parte delle mura della Città. Cresce a piccoli cespugli.

Agaricus monstruosus.

Solitario e di statura mediocre. Il Cappello è piano, di figura irregolare, non carnoso, anzi quasi coriaceo, color di pattona-cupo, o sivvero di Castagnaccio, e con il margine arricciato verso le Lamelle, le quali sono assai distanti fra loro, pallide, e quasi carnicine. Il gambo comincia dalla di lui inserzione con il Cappello in un grosso tuberculo solcato, e dalla metà del medesimo fino alla base cilindrico; tutto il gambo è pieno, alquanto pallido, anzi inclina piuttosto al colore del Cappello, e i di lui solchi bianchi. La Carne è bianchissima. Tav: III. fig. 5.

a. veduto inferiormente.

b. veduto superiormente.

Nel mese di Novembre in Boboli nelle vicinanze del così detto Laberinto.

Aga-

Agaricus filiformis.

Solitario, piccolissimo, e molto fragile. Il Cappello campaniforme, giallo ocraceo, peloso al margine, i di cui peli sono oscuri. Le Lamelle bianche. Il gambo filiforme, fistuloso, e color rosso-sanguigno. Tav: III. fig. 6.

a. veduto superiormente.

b. veduto per la parte inferiore.

Nel mese di Novembre a S. M. a Montici sopra le Foglie putride del *Quercus Ilex Linn.*

Agaricus subulatus.

Il Cappello è fatto a guisa d' Ombrello, non carnoso, color verde-oliva, e tomentoso, che sembra un velluto: il margine arricciato verso le Lamelle, le quali sono pallide, semplici, e distanti fra loro. Il gambo è lunghissimo, subulato, pieno, e giallognolo. Tav: IV. fig. 1.

a. Il Fungo giovine nel suo primo sviluppo.

b. Il Fungo già adulto.

Trovasi nei mesi di Settembre e Ottobre nel Bosco presso il così detto *Pollajo alle Rose*.

Agaricus dentato-crenatus.

Il Cappello è convesso-conico-acuminato, giallo, ocraceo-fusco nel centro, con strie del medesimo colore, le quali principiando dal centro medesimo vanno fino al margine, il quale è dentato-crenato. Le Lamelle bianchissime. Il gambo del medesimo colore, fistuloso, e alquanto ingrossato verso la base. Tav: IV. fig. 2.

Nel mese d' Ottobre lungo l' Argine del Fiume Arno dirimpetto le R. Cascine.

Aga-

Agaricus rubro-maculatus.

Solitario. Il Cappello emisferico, liscio, e color di Filiggine. Le Lamelle numerose, olivacee, e fragili. Il gambo lungo, sottile, lineare, fistuloso, fragile, pallido, e sparso di piccole macchie sanguigne. Tav: IV. fig. 3.

Nel mese di Novembre a Scandicci alto.

Agaricus pilosus.

Solitario. Il Cappello emisferico-globoso, liscio, e turchino. Le Lamelle vinate, semplici, e carnose. Il gambo terete, bulboso, pieno, color carnicino, peloso, e i di cui peli sono bianchi. La Carne è parimente bianca. Tav: IV. fig. 4.

In Autunno in una Macchia presso S. Matteo in Arcetri.

Agaricus pygmaeus.

Solitario, carnoso, e nano di statura. Il Cappello piano-subconcavo, di color grigio, e con il margine sublobato-ondulato. Le Lamelle pallide, duplicate, ovvero disposte due per due. Il gambo cortissimo, pieno, rotondo, e olivaceo. Tav: IV. fig. 5.

Nel mese di Marzo nel Bosco di Montesenario.

Agaricus rubro-striatus.

Solitario, in forma d' imbuto, intieramente giallo, e con la superficie del Cappello rigata di rosso. Il gambo pieno, e cilindrico. Le Lamelle decurrenti, e quasi ramose. La Carne d' un color giallo-dorato. Tav: IV. fig. 6.

Nel mese d' Ottobre nel luogo sopraddetto.

Aga-

Agaricus fuscus.

Solitario. Il Cappello emisferico, fosco, e liscio. Le Lamelle del medesimo colore. Il gambo cilindrico, carnoso, pallido e asperso di spruzzi sanguigni. Tav: IV. fig. 7.

In Autunno alla Romola.

Agaricus subsquamosus.

Solitario. Il Cappello è convesso, bianco, sparso di piccole squamme rosso-sanguigne, le quali a prima vista sembrano piuttosto altrettante piccole strie, o linee disposte inegualmente in tondo alla superficie del Cappello medesimo. Le Lamelle bianche. Il gambo parimente bianco, alquanto lanoso alla base, cilindrico, e vuoto. Questa specie è assai velenosa, ed ha un forte odore nauseante, il quale appena si può soffrire qualche poco di tempo. Tav: IV. fig. 8.

a. veduto inferiormente.

b. veduto superiormente.

Nel mese di Novembre nel Bosco detto della Fattucchia di là dal Fiume Ema, due miglia circa distante dalla Città fuori della Porta S. Niccolò.

Agaricus coeruleus.

Solitario. Il Cappello convesso, ceruleo, trasparente, e quasi pieghettato. Le Lamelle nere, fragili, e nella sua maturità si dissolvono in un Umore acquoso e nero. Il gambo molto lungo, sottile, lineare, gracilissimo, vuoto, e dell' istesso colore del Cappello. Tav: IV. fig. 9.

Nel mese di Novembre nelle R. Cascine.

Aga-

Agaricus rubellus.

Solitario, e piccolissimo. Il Cappello piano convesso, e alquanto rossigno. Le Lamelle bianche. Il gambo fistuloso, gracile, rotondo, e parimente bianco. Tav: IV. fig. 10.

Nel mese d' Ottobre a piè d' un Olivo nelle vicinanze di Trespiano.

Agaricus conoideus.

Solitario, e piccolissimo. Il Cappello è conico, in parte rosso, ed in parte giallo, particolarmente verso il margine. Le Lamelle bianche, e distanti fra loro. Il gambo parimente bianco, lineare, e quasi fistuloso. Tav: IV. fig. 11.

Nel mese di Novembre nella così detta Ragnaja del Vecchietti.

Agaricus bulboso-pilosus.

Solitario, e intieramente bianco. Il Cappello convesso glutinoso, e con piccoli solchi giallognoli al margine. Lamelle numerose. Il gambo bianchissimo, bulboso alla base, pieno, e il di cui bulbo è ricoperto di peli piuttosto lunghi più bianchi ancora del gambo medesimo. Tav: IV. fig. 12.

Trovato nel mese di Decembre nel Giardino botanico del R. Museo ec. in un' Areola nel Parterre delle Piante officinali.

Merulius albus.

Tutto il Fungo è bianco, e non carnoso. Il Cappello infundibuliforme. Vene ramose, decurrenti, e color cenerino. Il gambo sottile, e un pochino fistuloso. Tav: IV. fig. 13.

Nel mese di Decembre a piè d' un Cerro nelle vicinanze di Trespiano.

Bo-

Boletus tomentosus .

Il Cappello è piano , tomentoso , e color di marrone . I Tubi minutissimi , rotondi , in principio bianchi , e nell' invecchiare divengono color di zolfo-chiaro . Il gambo fistuloso , fragile , ingrossato alla base , tomentoso , e dell' istesso colore del Cappello . La Carne è bianchissima . Tav: V. fig. 1.

Trovasi in Autunno in Boboli .

Boletus maculatus .

Il Cappello emisferico , rosso , e con delle strie longitudinali rosso-scure . I Tubi minuti , corti , quasi angolati , e color canarino . Il gambo molto lungo , carnoso , alquanto ingrossato alla base , color castagno-chiaro , e asperso di macchie scure . La Carne è bianca , e un poco dura . Tav: V. fig. 2.

Nel mese di Marzo a Montesenario .

Boletus rubro-punctatus .

Intieramente bianco . Il Cappello convesso, e alquanto glutinoso . I Tubi minuti corti , e quasi rotondi . Il gambo cortissimo , e asperso di punti rosso-sanguigni . Rompendolo esce un Umore lattiginoso alquanto denso . Tav: V. fig. 3.

Nel mese di Settembre alla Romola .

Boletus bicolor .

Il Cappello è quasi conico , liscio , e color grigio-carneo . I Tubi minuti , angolati , e gialli . Il gambo del medesimo colore del Cappello , terete , e bulboso-globoso alla sua estremità , con la quale s' unisce al Cappello . Tav: V. fig. 4.

Nel mese di Ottobre nel Bosco della Real Villa di Pratolino .

Hyd-

Boletus ruber.

Il Cappello convesso-emisferico, e rosso. I Tubi minutissimi, angolati, e quasi dell' istesso colore, ma più chiari. Il gambo rotondo, lineare, piuttosto lunghetto, superiormente bianco, e rosso verso la base. Tav: V. fig. 5.

In Autunno nelle vicinanze della Romola.

Hydnum bicolor.

Il Cappello è concavo nel centro, color di mattone-chiaro, e con il margine un poco rivolto inferiormente. Gli Aculei sono bianchi. Il gambo parimente bianco, cilindrico, e alquanto torto. Tav: V. fig. 6.

Trovasi in Autunno in Boboli presso l' Isolotto dalla parte delle Mura della Città.

Hydnum bulbosum.

Il Cappello è alquanto convesso, e color di mattone. Gli Aculei dell' istesso colore, ma un poco più chiari. Il gambo bianco, carnoso, e ingrossato a guisa d' un bulbo alla base. Tav: V. fig. 7.

La grandezza del Cappello è assai variabile; nella figura *a* è rappresentato nella massima grandezza, e nella fig. *b* la minore; ed anche più piccolo.

Trovasi parimente nel sopra indicato luogo.

Hydnum pallidum.

Intieramente bianco-pallido. Il Cappello convesso, tomentoso, e di figura irregolare. Gli Aculei sono molto acuti, e numerosissimi. Il gambo laterale, pieno, e tomentoso. Tav: V. fig. 8.

Nel mese di Novembre in Boboli.

Hydnum roseum.

Il Cappello un pochetto convesso, e color di rosa. Gli Aculei bianchi. Il gambo parimente bianco, terete, e pieno. Tav: II. fig. 3. *Volg.* steccherino color di rosa.

Nel mese di Novembre nel Bosco presso la R. Villa di Pratolino.

Clavaria minuta.

Candida, ramosa, minutissima, e fragilissima; rami tereti, ottusi, e cortissimi. Tav: V. fig. 14.

Trovasi nel mese di Novembre sopra i rami del Ginepro (*Juniperus communis Linn.*), e particolarmente sulla Strada, che conduce alla Villa dell' Ill. Sig. Marchese Gerini verso la Concezione.

Helvella bicolor.

Il Cappello è superiormente color d' ocra-scura, inferiormente bianco, e piegato per la metà, le di cui punte provenienti dalla piegatura sono volte all' insù formando presso a poco una mezza Luna. Il gambo cilindrico, pieno, e bianco. Tav: V. fig. 10.

Nel mese di Novembre nel Bosco di Monte Oliveto.

Helvella tomentosa.

Il Cappello è quasi rotondo, con il margine quasi ondulato, e rivolto insù. Il gambo è pieno, rotondo, alquanto ingrossato verso la base, e spesso ancora compresso. La Carne tanto del Cappello, che del Gambo è scura tendente al nero, e un poco gelatinosa. Tutta la superficie sì del gambo, che della parte superiore e inferiore del Cappello è ricoperta da un tomento di color carnicino-chiaro. Tav: V. fig. 11.

a.

a. Veduta per la parte superiore del Cappello.

b. Veduta per la parte inferiore del medesimo.

Trovasi nei mesi di Novembre, e Dicembre in Boboli in alcuni Boschetti presso l' Anfiteatro.

Helvella undulata.

Il Cappello è nella parte superiore di color nericcio, e inferiormente color d' Ocra-scura: margine intero, e ondulato. Il gambo è parimente ocraceo-scuro, corto, pieno, e lineare. Tav: V. fig. 12.

Nel mese di Novembre alla Romola.

Peziza sanguinea.

Sessile, globosa, liscia, internamente carnicina, esternamente di color sanguigno, e con il margine dentato, i di cui denti sono alquanto ottusi. Tav: V. fig. 13.

Nel mese d' Ottobre nei Boschi della Certosa presso il Fiume Greve.

Lycoperdon clavariaeformis.

Pedunculato e subramoso, bianco, ovale, o sivvero di forma olivare, e la di cui superficie è sparsa di corti aculei, ovvero punte triangolari, nere, e distanti fra loro: polline grigio. Il gambo è parimente bianco, liscio, pieno, e rotondo. Tav: V. fig. 9.

Nel mese di Novembre a Monte Murello.

NUO-

NUOVI GENERI.

Myklichenia.

Fungus subgelatinosus, expansus, laciniatus-ramosissimus, & fructificatione in ejus superficie conspersus.

Myklichenia repens.

Bianco-candida, serpeggiante, di sostanza Fungoso-gelatinosa, laciniata, e le di cui lacinie sono terminate da delle diramazioni setacee, le quali poi ingrossandosi e diramandosi sempre più, si anastomizzano insieme, e formano quella sostanza Fungoso-gelatinosa sopra indicata.

Trovasi in Autunno in Boboli sparsa fra le Foglie putride di Leccio, ed anche sopra la nuda Terra.

Agaricum lichenosum, album, eleganter laciniatum, brumali tempore inter humum, & putrida arborum folia late se diffundit, ac crescit. Mich. Nov. pl. gen. p. 125. Tav: 66. fig. 5.

La sostanza alquanto fungosa, la figura, e la maniera di vegetare di questa specie di Fungo molto simile a quella dei Licheni, mi hanno determinato di adottare, nella denominazione della medesima, il termine *Myklichenia* formato dalla riunione dei due vocaboli greci μύκης, che significa Fungo, e λιχένες, che significa Lichene (*). Per abbreviare questo nome, e renderlo ancora meno aspro a pronunziarlo, ho stimato bene il tor via le due ultime lettere ης dal vocabolo μύκης.

Böh-

(*) Il termine Lichene, o *Lichen* è stato appropriato dai Greci ad una specie di Pianta, che nasce in luoghi sassosi e umidi, specialmente nelle cascate d'Acqua, la qual Pianta viene dai Latini chiamata *Lichen* e dagl' Italiani *Fegatella* per aver la medesima la proprietà di guarire una specie di Male, che nasce nella Faccia e particolarmente nel Mento, la qual Malattia vien detta dai Greci λιχένες *Lichenas*, e dai Latini *Mentagra*. (ved. Plinio Lib. 26 cap. 4).

Böhmia.

Fungus membranaceus, pellucidus, erectus, & vessiculis seminalibus ad ejusdem oras, & periferiam conspersus.

Böhmia muscoides.

Flabelliforme ovvero fatta a foggia di ventaglio, membranosa. eretta, trasparente, del colore dell' Argilla, plicato-dentata al contorno, i di cui denti sono alquanto rotondi. e con una continuazione laterale a guisa di un piccolo gambo, lineare, della medesima sostanza, parimente membranosa, e trasparente. Tav: V. fig. 15.

A. Le vessichette seminali ingrandite sotto il Microscopio, e le quali non sono punto visibili all' occhio nudo.

Trovasi nel mese di Novembre tra il Musco nei Boschi presso Cercinia.

Questo genere è stato da me dedicato, in contrassegno d' amicizia, al Sig. Giovanni Battista Böhm di Nazione Tedesco, e segnatamente nativo di Vienna, il quale dall'Anno 1797 al 1800 inclusive fu impiegato nella Legazione Imperiale Austriaca presso la Real Corte di Toscana.

IN-

INDICE

DI TUTTI LI GENERI E SPECIE

OSSERVATI

DAL SIG. RADDI

E de' quali ha mandato la descrizione alla Società non avendo trovato luogo nel Tomo presente che quella delle specie nuove

Agaricus abbreviatus.
acerrimus.
acicularis.
acris.
adherens.
adustus.
aggregatus.
alabastrinus.
alliaceus.
alutaceus.
amarus.
androsaceus.
angulatus.
aqueus.
armeniacus.
atrosquamosus.
atro-tomentosus.
Balanus.
Beryllus.
bicolor.
bulbosus.
bulboso-pilosus Nob.
caerulescens.
caliciformis.
campanulatus.
Agaricus campestris.
candido-bulbosus.
caryophillaeus.
castaneus.
cereolus.
cespitosus.
cinereus.
cinnamomeus.
clavus.
coeruleus Nob.
cochleariformis.
confertus.
conicus.
conoideus Nob.
crassipes.
crenulatus.
croceus.
cuspidatus.
decurrens.
deliciosus.
dentato-crenatus Nob.
dentatus Nob.
dimidiatus.
dulcis.
elatior.

Aga-

Agaricus elegans Nob.
emeticus.
esculentus.
fagineus.
fallax.
farinosus.
fascicularis.
fastigiatus.
ferrugineus.
filiformis Nob.
flabellatus.
flabelliformis.
flammeus.
flavidus.
floccosus.
fragillimus.
fragilis.
fuliginatus.
fulvescens.
fuscescens.
fusco-cano-tomentosus Nob.
fuscus Nob.
fusipes.
gelatinosus.
giganteus.
gilvus.
glaucus.
griseo-albus.
griseus.
hirtus.
holosericeus.
hypni.
janthinus.
incertus.
infundibuliformis.
Agaricus involucratus Nob.
involutus.
integer.
laccatus.
laceratus.
lacrimalis.
lactifluus.
leoninus.
lingua.
longipes.
lucens.
lycoperdonoides.
melleus.
michelianus Nob.
minor.
minutulus.
monstruosus Nob.
muscarius.
muscorum.
mutabilis.
neptuneus.
niger Nob.
nitens.
niveus.
obscurus.
ochraceus.
olivaceus.
ostreatus.
ovatus.
pallidus.
perforans.
phosphoreus Nob.
Phalloides Nob.
pilosulus.
pilosus Nob.

Aga-

Agaricus piperatus.
plicatus.
plumbeus.
plumosus.
pratensis.
procerus.
pusillus.
pygmeus Nob.
pixidatus Nob.
radians:
radiatus.
Rotula.
rubellus Nob.
rubro-maculatus Nob.
rubro-striatus Nob.
rufescens.
rufus.
Russulla.
sanguineus.
sanguinolentus.
saccharinus.
scissus.
scrobiculatus.
semipetiolatus.
sericeus.
setaceus.
sordidulus.
stellatus.
striatellus.
striatus.
subcoriaceus.
subscrispus Nob.
subferrugineus.
subgranulatus.
subsquamosus Nob.
Agaricus subulatus Nob.
succineus.
sulphureus.
tenuis.
terreus.
tomentosus.
torminosus.
tremulus.
turbinatus.
umbellatus.
umbelliferus.
umbilicatus.
vaccinus.
Vaillantii.
varius.
velutipes.
ventricosus.
versicolor.
violaceus.
virescens.
virgineus.
viridis Nob.
viridissimus Nob.
viscosus.
Xerampelinus.
Böhmia muscoides Nob.
Boletus bovinus.
bicolor Nob.
fagineus.
fasciatus.
Favus.
fragilis.
hepaticus.
ignavius.
infundibuliformis.

Bo-

Boletus lapidum.
lobatus.
luteus.
maculatus Nob.
medulla panis.
mesentericus.
mutabilis.
nitens.
obliquatus.
pallescens.
pusillus.
ramosissimus.
ruber Nob.
rubro punctatus Nob.
suaveolens.
subtomentosus.
subvescus.
sulphureus
tomentosus Nob.
tuberosus.
versicolor.
viscidus.
Clathrus cancellatus.
Clavaria candidissima.
coralloides.
Cornu Alces.
Cornu Cervi.
cornuta.
cylindrica.
delicatula.
fistulosa.
inaequalis.
media.
minuta Nob.
muscoides.
Clavaria pistillaris.
purpurea.
simplicissima.
Cyathus crucibuliformis.
Cupula.
striatus.
laevis.
Fuligo panicea.
septica.
Helotium cucullatum.
Helvella bicolor Nob.
brunnea.
ciliaris.
coccinea.
cocleata.
hispida.
Mitra.
pallida.
revoluta.
sulcata.
tomentosa Nob.
undulata Nob.
Hydnum album Nob.
bicolor Nob.
bulbosum Nob.
candidum.
coralloides.
cyathiforme.
imbricatum.
pallidum Nob.
pectiniforme.
repandum.
roseum Nob.
rufescens.
tomentosum.

f.a 1. a
2.
3.
b

a
b

a
f. 1.
b
2.
3.
4.
a
b
5.
a
b
6.

a
f. 1.
b
2
10
11
3
13
12
4
5.
6
7.
a
b
8.
9.

f.a 1.
2.
3.
a
b.
6.
a
b
7.
4.
5.
a
b
8.
9.
10.
a
b
11.
12.
15.
A
a.
b.
14.
13.
Ant. Morciai pinx.

Hydnum Zonatum.
Lycoperdon atrum.
Bovista.
capitatum.
circumscissum.
Clavariaeformis Nob.
furfuraceum.
Geaster.
gemmatum.
lacerum.
multifidum.
muricatum.
polyrhizon.
punctatum Nob.
pyriforme.
squamosum.
Merulius albus Nob.
alneus.
Cantharellus.
inflexus.
pezizoides.
quercinus.
Monilia cespitosa.
Mucor minimus.
Mucedo.
Myklichenia repens Nob.
Peziza acetabulum.
Auricula.
bulbosa.
caliculus.
ciliaris.
convivalis.
coronata.
Crater.
crenata.
Peziza crucibulum.
cupressi.
Fungoidaster.
hians.
hirta.
hispida.
lacera.
minutissima.
nigrescens.
nutans.
pustulata.
quercina Nob,
sanguinea Nob.
scutellata.
sepulcralis.
tuberosa.
varia.
viridans.
Phallus esculentus.
impudicus.
Reticularia fragilis.
Sphaeria Hypoxylon.
Spumaria Mucilago.
Stemonitis crocea.
vitellina.
Thaelaephora applanata.
mesenterica.
mesenteriformis.
sericea.
Tremella juniperina.
Nostoc.
Sagarum.
verrucosa.
Tuber gulosorum.

DEL-